



Red Fitosanitaria de Aragón
Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 23

Junio de 2022

OLIVAR

ESTADO FENOLÓGICO

Fenología

La totalidad de las comarcas están en fruto cuajado **G**, la comarca del Somontano se encuentra un poco retrasada y esta ahora en final de floración y fruto recién cuajado.



G Fruto cuajado


MOSCA DEL OLIVO (Bactrocera oleae)

Después de floración empieza el seguimiento y control de la mosca del olivo, con la colocación de las trampas cromáticas para seguir el vuelo de adultos, cuando se produzca el endurecimiento del hueso se controlara también la picada de mosca en frutos.

Se emitirán los pertinentes avisos cuando sea necesario realizar tratamientos.

PRAYS (*Prays oleae*) Generación Carpófaga

Ya se vuelven a producir capturas de la generación Carpófaga en esta próxima semana y la siguiente realizarán la puesta en los frutos, las larvas al nacer se introducirán en el interior de la aceituna.



BARRENILLO NEGRO (*Hylesinus oleiperda*)

El día 10 de junio se emitió un aviso fitosanitario para el barrenillo negro, con especial atención en las comarcas de Belchite y Borja ya que es donde mayor incidencia hay de este barrenillo.

El tratamiento para el Prays carpófaga sirve también para el barrenillo negro



Agujeros de salida de *Hylesinus*