

CULTIVO: ARROZ

MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS EN PRODUCCION INTEGRADA Y LAS RESTRICCIONES DE USO

Cada materia activa está admitida solamente en los cultivos y contra los parásitos mencionados en el presente cuadro. El número máximo de tratamientos admitidos con cada materia activa que se indica en la columna de restricciones indica las veces que puede ser utilizada cada materia activa por ciclo del cultivo, sea cual sea el parásito tratado. Por lo tanto, si por ejemplo, se ha hecho un tratamiento contra piricularia con tebuconazol y el número máximo de tratamientos es uno, no puede volverse a utilizar tebuconazol en ese mismo año ni contra piricularia ni contra otro parásito.

Antes de realizar una aplicación fitosanitaria, se deben asegurar que el producto esta autorizado, tanto en el cultivo como en la plaga en el momento de la utilización, en la página: <http://www.mapama.gob.es>

INSECTICIDAS

| MATERIA ACTIVA | PARÁSITO | RESTRICCIÓN DE TRATAMIENTOS |
|--|--|-----------------------------------|
| acetamiprid | pulgones | Máximo un tratamiento |
| | | Trampeo masivo |
| <i>Bacillus thuringiensis aizawai</i> | orugas (<i>Spodoptera</i> sp. y <i>Mythimna unipunctata</i>) | Máximo un tratamiento |
| <i>Bacillus thuringiensis kurstaki</i> | orugas (<i>Spodoptera</i> sp. y <i>Mythimna unipunctata</i>) | Máximo un tratamiento |
| cipermetrin 0,35% | puudenta | Una única aplicación por campaña. |
| diflubenzuron | quironómidos, mosquitos | Máximo un tratamiento |
| tebufenocida | barrenador orugas defoliadoras | Máximo un tratamiento |
| tebufenocida | barrenador y orugas defoliadoras | Máximo un tratamiento |
| z-11-hexadecenal+ z-9-hexadecenal + z-13-octadecenal | chilo | Confusión sexual |

FUNGICIDAS

| MATERIA ACTIVA | PARÁSITO | RESTRICCIÓN DE TRATAMIENTOS |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| ¹ azoxistrobin | <i>Helmintosporium</i> y <i>Piricularia</i> | Máximo 1 tratamiento |
| procloraz | | |
| procloraz + propiconazol | | |
| picoxistrobin | <i>Piricularia</i> y <i>Helmintosporium</i> | máximo 1 tratamiento |

¹No utilizar en dos campañas seguidas, rotando con otros fungicidas con diferente modo acción.

HERBICIDAS

| MATERIA ACTIVA | MOVILIDAD EN EL SUELO (ÍNDICE GUS) |
|-----------------------------|------------------------------------|
| azimsulfuron | Alto |
| bentazona | Alto |
| bensulfuron metil | Alto |
| bispiribac sodio (1) | SC |
| cicloxdim | Alto |
| cihalofop butil (2) | Bajo |
| cletodim | Bajo |
| clomazona | Alto |
| diquat | Alto |
| halosulfuron metil (1) | SC |
| imazamox | Alto |
| MCPA | Alto |
| pendimetalina | Alto |
| pendimetalina + clomazona | Alto |
| penoxulam (1) | SC |
| penoxulam + cihalofop butil | SC |
| profoxidim (1) | SC |
| propaquizafop | Medio |

(1) Solo una aplicación por campaña.

(2) Hasta dos aplicaciones por campaña sin sobrepasar 1,5 l/ha. y campaña.

SC Sin clasificar